

Protocole HERCEPTIN _ Sous cutané				Version n°3 Du : 11/04/2018		
Médicaments à domicile		Dose	Mode d'admin.	Temps d'admin.	Contenant	Diluant/volume
J1	HERCEPTIN	600 mg	Sous cutanée	2 à 5 minutes	Seringue de 10 ml	Produit pur
Cycle : J1-J21						
Surveillance biologique :						
<ul style="list-style-type: none"> - Fait lors des consultations si nécessaire 						


MODALITES DE PRESCRIPTION

 HAD
 HDJ

 OK chimio

Nombre de cycles selon avis médical avec une moyenne d'environ 1 an :

- La première injection, au minimum, se fait en HDJ
- A partir du 2^e cycle les injections peuvent se faire en HAD
- Consultation oncologue avec bilan complet tous les 3 mois



SUIVI CLINIQUE AVEC L'ONCOLOGUE/ HEMATOLOGUE

Le patient sera vu en consultation par le médecin oncologue tous les 3 mois environ pour évaluation de l'efficacité, de la tolérance et contrôle cardiaque. Il est préférable que le contrôle cardiaque et la consultation aient lieu avant la 5^e cure.

Par ailleurs, chaque injection à domicile doit être validée par un médecin mais à titre exceptionnel (au vue de la fréquence des injections) cette validation n'est pas obligatoirement réalisée en présentiel. Elle peut être réalisée en utilisant par exemple des outils de télémédecine.

MODALITES D'ADMINISTRATION ET DE SUIVI

Traitements réalisés à domicile : à partir du 2^e cycle.

La réalisation des bilans biologiques (date et fréquence) dépend du mode de fonctionnement de l'établissement référent.

Avant chaque injection, interroger le patient sur l'apparition d'éventuels effets secondaires. En l'absence d'effets secondaires vous pouvez effectuer l'injection, sinon avis médical nécessaire.

PROCEDURE DU TRAITEMENT

1. Désinfecter la zone d'injection avec de l'alcool
2. Préparer la peau en regard du lieu d'injection.

Le site d'injection doit être alterné entre **la cuisse gauche et la cuisse droite**.

Chaque nouvelle injection doit être pratiquée à au moins 2.5 cm de distance du site précédent et en aucun cas sur une zone sensible présentant une ecchymose, une rougeur ou une induration.

3. Afin de réduire l'incidence des réactions locales au site d'injection, **ne pas purger l'aiguille**.
4. Effectuer un retour avant d'injecter afin de s'assurer de ne pas injecter dans un vaisseau sanguin.
5. Injecter la seringue d'Herceptin au niveau de la cuisse droite ou gauche pendant 2 à 5 minutes, **ne pas injecter plus de 0,5 ml la première minute** afin de permettre à la hyaluronidase d'agir pour la suite de l'injection. L'injection doit se faire avec une pression continue sans à-coups.
6. Un système de surveillance dans les 2 heures post injection doit être mis en place.

Noter sur le cahier de liaison tous les actes réalisés et les effets secondaires éventuels du traitement.

EFFETS INDESIRABLES

- Allergies lors des premières injections.
- Surveillance cardiaque nécessaire tous les 3 mois.

En cas d'apparition d'effets indésirables, veuillez contacter le numéro d'avis/ d'urgence fourni par l'HAD.